

CAPACITÉS COGNITIVES DES PSITTACIDÉS

- Oiseaux, pendant longtemps, = parents pauvres des études portant sur la cognition animale.
- Méthode modèle / rival (**compétition hiérarchique**), initiée chez l'homme par A Bandura, appliquée, par la suite, chez le perroquet.
- Travaux de D Todt, en Allemagne, d'I Pepperberg aux Etats-Unis, de B Chauvin, C Chardard-Segurel, en France.



LE PERROQUET, CAPABLE DE TÂCHES COGNITIVES COMPLEXES

- Compréhension, abstraction, numérisation, mémorisation, imitation, altruisme, instinct ludique, utilisation d'outils.
- 'Intelligence' du perroquet = « capacité à trouver de nouvelles solutions » (L Lefebvre)
- Pour I Pepperberg, il a l' 'intelligence' et

COMPORTEMENT NORMAL



1 - En milieu naturel

- **Idéal = élevage parental :**
sécurisant, alimentation adéquate,
apprentissage du milieu de vie et de la
vie
en groupe, recherche des aliments,
acquisition des réflexes de défense /
des
prédateurs, éveil à la vie en groupe avec
ses
rapports hiérarchiques, acquisition des
vocalisations, des attitudes corporelles
à

- Oiseau devenu adulte, en milieu naturel.

-Formation d'un couple :

habituellement monogame et fidèle

stimulation des interactions sociales

acquisition des dialectes de

reconnaissance

attitudes agressives inter-spécifiques

rare,

essentiellement pour la défense de la

zone de

nidification ('prises de bec' en général

2 - En captivité

a) *Oiseaux capturés dans la nature.*

- Prélèvement in situ = source de massacres,

voire d'extinction de certaines espèces. Une

interdiction d'importation, pour l'Europe, d'oiseaux sauvages, vient d'être décrétée.

_ elle va permettre, aux éleveurs sérieux,

b) Oiseaux nés en captivité

- élevage parental :

en nid artificiel - apport bénéfique de l'éducation parentale .

- 'élevage main' :

pression de la demande des particuliers.

nombreux stress _ lumière vive, bruits, manque de stimuli, d'interactions sociales,

de règles éducatives de base, oiseaux souvent vendus non complètement sevrés,

TROUBLES DU COMPORTEMENT



Troubles du comportement

Cumul de stress _ apparition de ' TOC ' .

« oiseau-proie » (J Vaillancourt).

« radar à émotions » (M Doolen).

1- Agressivité

Naturelle et limitée dans la nature.

En captivité, exprime des peurs, ou un excès d'imprégnation, vis-à-vis d'une personne.

Se traduit par des blessures entre oiseaux (impossibilité de fuir), ou des morsures chez l'homme.



2- Cris

Naturels, à l'état sauvage (communication interspécifique, alerte).

En captivité, salut au lever du jour, accueil

du maître, mais aussi expression de peurs

de souffrance

tentatives p



"Hello, you have no new messages, hello, you have no new messages, hello, you have no new messages..."

plement

e.

3- Déviations à caractère sexuel.

Régurgitations, masturbation traduisant un hyper-attachement à une personne.
Miroir.

4- Mouvements stéréotypés.

Mouvements répétitifs, de durée variable,
en réaction à des situations conflictuelles :
- mordillements nerveux des doigts.




5- Picage.

Il s'agit certainement là, du trouble le plus frustrant, pour le maître,... le vétérinaire et, bien entendu pour le perroquet lui-même !

L'origine est plurifactorielle , mais, pour l'essentiel , psychique.

— ‘ *maladie de la captivité* ’

6- Surtoilettage.



TRAITEMENT

Bilan clinique préalable, complet, indispensable.

- Ce bilan sert à éliminer toute origine organique.
- Ensuite, seulement, on peut songer à faire passer, le perroquet (et son maître !), sur le divan.
- Tout traitement est à long terme.

1) Thérapie comportementale

Chercher à renforcer les comportements positifs.

Anticiper si possible le déclenchement du trouble et proposer une activité substitutive.

Agressivité _ sécuriser l'oiseau et son environnement. Eviter toute confrontation stérile. Pratiquer une thérapie de groupe, en zone neutre.

Cris _ ne pas répondre à la sollicitation et, encore moins en criant après l'oiseau (renforcement négatif)

'Punir' = mise en obscurité temporaire, jet d'eau

à distance.

Entretenir une conversation, avec l'oiseau, d'une pièce à l'autre.

Déviations à caractère sexuel _ rompre le contact,

éviter certaines caresses.

Mouvements stéréotypés _ chercher quel peut être le facteur déclenchant, à éliminer.

Picage _ il n'existe pas de 'pilule miracle' mais

2) Thérapie médicamenteuse

Un apport éventuel d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques peut, dans certains cas, conforter

une thérapie comportementale. Traitement ! à 2 mois : halopéridol, fluoxétine, clomipramine...

Ne règle, en aucun cas, le problème de fond.

PRÉVENTION

'Elevage-main', à petite échelle, par de vrais professionnels. Oiseaux vendus totalement sevrés.

Bien expliquer la marche à suivre (rôle essentiel du



MERCI POUR VOTRE ATTENTION